

Rilevazione I Quadrimestre 2026	B			D			P			U		
	Totale prenotazioni	Tempo Medio di attesa	% di garanzia ex ante	Totale prenotazioni	Tempo Medio di attesa	% di garanzia ex ante	Totale prenotazioni	Tempo Medio di attesa	% di garanzia ex ante	Totale prenotazioni	Tempo Medio di attesa	% di garanzia ex ante
VISITA NEUROLOGICA	167	6.8	97.6%	220	41.1	45.9%	171	97.4	43.9%	5	2.0	80.0%
VISITA GENERALE UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	423	6.4	97.9%	613	13.8	92.2%	476	20.4	99.4%	23	2.1	95.7%
VISITA GENERALE REUMATOLOGICA	118	8.1	95.8%	293	63.6	24.2%	273	77.8	96.7%	2	2.5	100.0%
VISITA GENERALE GERIATRICA	7	20.3	42.9%	90	36.9	10.0%	119	37.2	100.0%			
VISITA GENERALE EMATOLOGICA	126	13.1	83.3%	131	55.2	57.3%	119	127.7	46.2%	5	1.6	100.0%
VISITA GENERALE DIABETOLOGICA	98	12.6	83.7%	109	29.8	49.5%	134	106.2	47.8%			
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE. Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1). Non associabile a 92.05.F, 9	3	93.3	0.0%	26	80.9	53.8%	45	138.6	46.7%			
TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]	3	4.7	100.0%	12	19.7	91.7%	6	12.7	100.0%			
TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. Non associabile a 88.39.2, 88.39.3 e 88.39.A	1	7.0	100.0%	4	23.5	100.0%						
TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5)				1	26.0	100.0%						
TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e sur	4	8.0	100.0%	2	20.5	100.0%	2	186.0	0.0%			
TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C				1	26.0	100.0%						
TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C	36	8.2	97.2%	31	23.7	100.0%	11	131.8	36.4%	1	3.0	100.0%
TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E	78	7.6	94.9%	113	28.4	99.1%	88	165.3	27.3%	4	1.0	100.0%
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1), TC TOTAL BODY PER	3	3.0	100.0%	3	11.0	100.0%	2	57.0	100.0%			
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1), TC DELL' ADDOME INFE	12	3.7	100.0%	9	7.6	100.0%	4	16.3	100.0%			
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7)	11	3.0	100.0%	3	11.3	100.0%	1	6.0	100.0%			

TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)	38	4.3	97.4%	47	10.6	100.0%	27	12.3	100.0%	3	1.3	100.0%
SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA	100	5.5	98.0%	128	47.9	93.0%	113	161.5	65.5%	4	3.3	75.0%
RX DELL'AVAMBRACCIO	2	8.5	100.0%	3	57.3	66.7%						
RX DELLA SPALLA	9	8.7	100.0%	6	57.7	83.3%	6	56.8	100.0%			
RX DELLA MANO comprese le dita	3	27.0	66.7%	9	51.8	100.0%	9	62.0	100.0%			
RX DELLA GAMBA	1	9.0	100.0%	2	61.5	50.0%						
RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Incluso: studio dinamico	20	11.6	90.0%	51	52.8	82.4%	40	62.1	97.5%			
RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico	9	14.7	88.9%	28	54.5	75.0%	16	56.4	100.0%			
RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico	21	11.2	90.5%	27	53.7	85.2%	23	54.5	100.0%			
RX DELLA CAVIGLIA	3	8.3	100.0%	2	58.0	100.0%	3	60.3	100.0%	1	2.0	100.0%
RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale	48	8.9	97.9%	45	48.4	88.9%	48	62.9	97.9%			
RX DEL POLSO	1	63.0	0.0%	4	54.8	100.0%	2	56.5	100.0%	1	3.0	100.0%
RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita	7	9.6	85.7%	14	53.1	92.9%	13	49.0	100.0%			
RX DEL GOMITO	1	9.0	100.0%	1	59.0	100.0%						
RX DEL GINOCCHIO	16	9.6	87.5%	38	56.0	76.3%	32	57.7	100.0%			
RX DEL FEMORE	1	8.0	100.0%	2	72.0	0.0%	2	53.5	100.0%			
RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM.	22	9.5	95.5%	54	53.4	98.1%	50	206.4	24.0%	1	3.0	100.0%
RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.97.9 e 88.97.C	1	8.0	100.0%	3	57.7	100.0%	1	378.0	0.0%			
RM DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare. Non associabi	2	8.5	100.0%	2	40.5	100.0%	3	250.3	33.3%			
RM DELLA SPALLA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	25	6.8	96.0%	28	54.2	82.1%	16	79.8	100.0%			
RM DELLA MANO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	2	5.5	100.0%	2	62.0	50.0%						
RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	3	6.3	100.0%	2	69.5	50.0%	1	83.0	100.0%			
RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOT (88.93.6)							1	26.0	100.0%			
RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOT (88.93.6)	60	9.6	95.0%	92	61.3	94.6%	54	212.9	18.5%	2	2.0	100.0%
RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOT (88.93.6)	5	7.6	100.0%	18	61.7	94.4%	6	152.3	50.0%	1	1.0	100.0%

RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	20	10.2	90.0%	41	64.0	87.8%	26	184.7	38.5%	2	1.5	100.0%
RM DEL POLSO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM . Non associabile a 88.94	2	6.5	100.0%									
RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	7	7.9	100.0%				4	70.5	100.0%			
RM DEL GOMITO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	1	7.0	100.0%									
RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	29	7.2	100.0%	24	57.5	75.0%	8	81.0	100.0%	1	2.0	100.0%
RM DEL COLLO [faringe, laringe, parotidoghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGI	1	9.0	100.0%				1	304.0	0.0%			
RM DEL BRACCIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94				2	55.0	100.0%						
RM DEL BACINO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	1	8.0	100.0%	1	373.0	0.0%	1	27.0	100.0%			
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa	175	12.4	92.6%	186	102.4	4.8%	135	409.7	3.7%	36	1.5	100.0%
PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRIA. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utiliz	348	10.7	94.3%	314	53.9	36.0%	363	149.1	35.3%	9	4.2	66.7%
PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	135	12.2	88.9%	211	48.6	47.9%	256	106.9	49.2%	4	2.0	100.0%
PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento	40	7.5	75.0%	137	13.8	94.2%	96	18.3	100.0%			
PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZ	346	6.5	98.3%	693	46.1	29.0%	857	140.3	42.4%	8	1.4	87.5%
PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o per	75	8.3	97.3%	104	61.3	6.7%	83	117.6	25.3%	1	10.0	0.0%
PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconcezionale. Non associabi	18	26.1	77.8%	28	128.2	39.3%	79	110.0	65.8%			
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	77	22.3	71.4%	74	97.8	10.8%	129	208.7	20.9%	1	1.0	100.0%
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale	519	6.9	96.1%	1162	22.8	71.9%	1022	77.3	84.6%	20	1.7	95.0%

PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza	25	6.8	96.0%	26	42.7	69.2%	31	92.3	64.5%	5	1.6	100.0%
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE	70	3.9	98.6%	74	17.2	82.4%	39	28.9	100.0%	9	1.6	100.0%
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)	541	4.6	98.7%	872	18.4	83.4%	933	49.6	97.5%	11	0.8	100.0%
ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPT)	3	10.7	66.7%	12	19.4	100.0%	30	21.6	100.0%			
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	2	7.5	100.0%									
MAMMOGRAFIA BILATERALE	64	6.1	100.0%	29	8.5	100.0%	32	27.1	100.0%	1	2.0	100.0%
IMPEDENZOMETRIA	18	19.7	83.3%	29	62.8	62.1%	41	94.2	82.9%			
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]. Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1), Esofagogastroduodenoscopia con bi	187	9.6	96.8%	218	66.5	88.5%	168	303.9	13.1%	2	10.0	0.0%
ESAME AUDIOMETRICO VOCALE	16	14.8	87.5%	17	61.9	70.6%	19	79.1	84.2%	1	3.0	100.0%
ESAME AUDIOMETRICO TONALE	31	11.6	93.5%	41	61.1	70.7%	55	78.4	85.5%	1	2.0	100.0%
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Inclusive tutte le fibre indagabili. Non associabile a 93.09.1	14	10.0	57.1%	40	76.2	35.0%	29	94.7	79.3%			
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Inclusive tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1	12	9.3	58.3%	46	70.0	41.3%	30	83.9	86.7%			
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter)	31	4.9	96.8%	43	7.9	97.7%	58	13.1	100.0%			
ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso: testicoli e annessi testicolari. Incluso: integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1	15	3.7	100.0%	14	22.3	100.0%	10	63.4	90.0%	1	1.0	100.0%
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione colordoppler	79	3.8	98.7%	64	54.3	100.0%	44	167.1	31.8%			
ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso: ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Colordoppler. Incluso: eventuale valutazione cl	1	9.0	100.0%				1	875.0	0.0%	1	1.0	100.0%
ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale. Incluso: colordoppler se necessario. Non associabile a ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE (8	3	1.7	100.0%	13	229.4	15.4%	20	157.6	60.0%			
ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi	25	4.9	100.0%	56	26.6	98.2%	51	57.5	100.0%	2	2.0	100.0%
ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pervi maschili o femminili ed ecografia sovrappubica. Incluso: Co	53	5.3	96.2%	84	22.6	100.0%	77	56.7	96.1%	2	1.0	100.0%

ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Incluso: Colordoppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.78.1	302	6.3	98.3%	589	26.7	98.1%	444	59.9	99.3%	8	2.5	100.0%
ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandol	51	16.3	86.3%	112	46.9	61.6%	493	94.7	70.8%	3	1.0	100.0%
ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. Incluso: colordoppler se necessario. Incluso: eventuale valutazione clinica	33	12.5	90.9%	40	303.9	57.5%	37	638.8	0.0%			
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	4	8.5	100.0%	4	66.5	50.0%	4	75.5	100.0%			
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	74	5.8	100.0%	121	63.7	57.9%	142	75.5	97.9%	4	3.3	75.0%
ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso: vasi viscerali	1	5.0	100.0%	1	60.0	100.0%	2	74.0	100.0%			
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacolog	71	5.7	98.6%	241	58.6	70.5%	243	75.4	98.8%			
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3)	272	6.0	96.7%	503	24.8	99.2%	413	59.7	98.1%	2	2.0	100.0%
COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24), PROCTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGI	214	11.6	91.6%	217	70.6	92.6%	235	463.4	18.3%	1	2.0	100.0%

N.B.: Per le prestazioni erogate prevalentemente come prestazioni di controllo all'interno di PDTA aziendali, che seppur a bassi volumi presentavano tempi di attesa elevati, si è data disposizione al CUP aziendale di procedere in overbooking o al liberarsi di slot per disdetta, si da recuperare i tempi di attesa. Pur attuata tale attività di governo delle liste di attesa, il dato non può essere eliminato dai flussi al SovraCup, pur avendo ottemperato ai bisogni di salute. Si sta altresì procedendo per quanto attuabile a verifiche di eventuali prestazioni pervenute a CUP/SovraCup come "prime visite" che abbiano tuttavia anamnesi già presenti negli archivi aziendali, si da ricondurle correttamente a prestazioni di controllo.